

PICK UP
01

新型コロナウイルス ワクチン接種に関するお知らせ

問合せ 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種コールセンター
☎34・6975 FAX34・6929
※午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日も受付)

新型コロナウイルスワクチン接種券の発送について

60歳～64歳の人(昭和32年4月2日～昭和37年4月1日に生まれた人)を対象に、6月28日(月)の週に順次接種券を発送します。(状況により変更する場合があります)

16歳～59歳の人(昭和37年4月2日～平成18年4月1日に生まれた人)への発送時期は、ワクチンの供給や60歳以上の人の接種状況に応じて決定します。詳細が決まり次第お知らせします。

65歳以上の人(昭和32年4月1日以前に生まれた人)で、接種券がまだ届いていない場合は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種コールセンターに連絡してください。



市ホームページ

基礎疾患がある人の事前申請について

豊田市に住民票がある16歳～59歳で基礎疾患がある人は、随時接種券を送りますので、事前に申請をしてください。

■申請方法 ※以下のいずれかの方法で申請してください

●インターネット(あいち電子申請・届出システム)からの申請 **推奨**

●郵送での申請 申請書を感染症予防課(〒471・8501、西町3-60)へ

●窓口での申請 申請書を市役所各支所へ

※市役所の窓口は、7月30日(金)まではワクチン接種インターネット予約支援窓口(南庁舎1階)、8月2日(月)からは感染症予防課(東庁舎4階)

※申請書は市役所、各支所で配布。市ホームページからもダウンロード可

インターネット
申請はこちらから



基礎疾患の範囲

●以下の病気や状態で、通院か入院をしている人

- ・慢性の呼吸器の病気
- ・慢性の心臓病(高血圧を含む)
- ・慢性の腎臓病
- ・慢性の肝臓病(肝硬変^{など})
- ・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病か他の病気を併発している糖尿病
- ・血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)
- ・免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
- ・ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている
- ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- ・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害^{など})
- ・染色体異常
- ・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- ・睡眠時無呼吸症候群
- ・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

●BMI(肥満度を表す体格指数)が30以上の人 ※BMI = 体重(キログラム) ÷ 身長(メートル) ÷ 身長(メートル)

インターネット予約の支援について

ワクチン集団接種のインターネット予約において、操作に不安があり、家族や知り合いに協力を依頼することが困難な人を対象にスマートフォンなどの操作の支援を行っています。

●とき

7月30日(金)までの午前9時～午後5時 ※土・日曜日、祝日を除く

●ところ

市役所ワクチン接種インターネット予約支援窓口(南庁舎1階)、各支所

※下山・藤岡支所は6月28日(月)から、小原支所は7月5日(月)から

●持ち物

- ・新型コロナウイルスワクチン接種券
 - ・ご自身のスマートフォン[※](インターネット接続ができる端末機器)
- ※ご自身のスマートフォンなどを持っていない人も利用できます



集団接種会場における地震、風水害など緊急時の対応について(全会場共通)

市内で震度5弱以上の地震が発生した場合や、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」・「暴風警報」・「警戒レベル4避難指示」・「警戒レベル3高齢者等避難」が発令された場合は、以下のとおり対応します。

- ・午前6時以前に解除された場合 … 平常通り
- ・午前6時を過ぎても発令中の場合 … **中止**
- ・開始後に発令された場合 … 発令後、**原則中止**

集団接種会場における地震、風水害など緊急時の対応について(全会場共通)

市内で震度5弱以上の地震が発生した場合や、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」・「暴風警報」・「警戒レベル4避難指示」・「警戒レベル3高齢者等避難」が発令された場合は、以下のとおり対応します。

- ・午前6時以前に解除された場合 … 平常通り
- ・午前6時を過ぎても発令中の場合 … **中止**
- ・開始後に発令された場合 … 発令後、**原則中止**

ワクチンを接種した人へ

●ワクチン接種は2回必要です

ファイザー社のワクチンは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けることになっています。1回目の接種から3週間を超えた場合は、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

●ワクチンを接種した後もマスクを着用しましょう

ワクチンを接種した人から他の人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。3密の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、引き続き、感染予防対策を行ってください。